

ما هي الزراعات المساعدة؟ 2



الباربا



الطماطم



الخيار



الخس



الجزر

الثوم



ما هي الزراعات المرافقة؟ 3



الكرافس



البابونج



الزعتر

فصيلة الثوميات

الحرارة المفضلة: من 10 الى 18 درجة.

عدد البذور في الغرام الواحد: 400

مدة صلاحية البذور: سنتين.

خصائص التربة: ضعيفة رملية جيدة الصرف.

درجة الحموضة: من 6 الى 6.8 .

فترة الزراعة: من غشت الى ديسمبر.

فترة النقل: من اكتوبر الى يناير في حالة زرع البذور.

فترة الجني: من فبراير الى يونيو

كيفية زراعة البذور:

بين الصوف: 0.20 الى 0.30 متر.

بين الشتلات: 0.07 الى 0.12 متر

كثافة الشتلات: من 400000 الى 500000 في الهكتار.

الإنتاج المرغوب فيه: من 10000 الى 12000 كيلوغرام في الهكتار.

كيف يتم الزرع؟ 1

حرث التربة بعد تسميدها



معالجة الفصوص بالرماد و محلول السالمية



زرع البذور في المشتل



غرس الفصوص مباشرة او نقل الشتلات بعد تقطيعها



ما هي الإجراءات الوقائية؟

- اختيار بذور أو فصوص سليمة و متأقلمة مع المناخ المحلي



- تجنب الزرع في أرض كانت بها إحدى الثوميات مدة 4 سنوات على الأقل.



- نقش التربة و إزالة الأعشاب المنافسة أو تتبين التربة



الأمراض:

الخصائص: ظهور بقع رمادية يترتب عنها تدمير الأوراق.



كيفية المعالجة: استعمال الحديدة الزرقاء (النحاس) واستعمال محلول الحريقية وكذا محلول السالمية.

الخصائص: اصفرار و ذبول أوراق النبتة المصابة.



كيفية المعالجة: استعمال مطبوخ الشيح.

الخصائص: فطر يتسبب في تخمج قاعدة البصيلة.



كيفية المعالجة: استعمال محلول الحريقية

الآفات:

الخصائص: نوع من الحشرات الصغيرة التي تتغذى على نسخ النباتات.



كيفية المعالجة: استعمال محلول الحريقية و الثوم و الصابون الاسود.

الخصائص: ديدان صغيرة جدا تصيب النبتة من الجذر.



كيفية المعالجة: استعمال محلول الطحالب او اللواية .

الخصائص: يرقة فراشة تتغذى على الأوراق.



كيفية المعالجة: استعمال محلول الحريقية، الثوم، الفلفل الحار، الشيبة و الأوكاليتوس.

الخصائص: يرقة ذبابة تحفر في الأوراق منتجتا دهاليز.



كيفية المعالجة: عزل المحصول بواسطة شبكة و استعمال فخاخ لإمساك الذبابة استعمال مطبخ المريوت بانتظام.

المريوت بانتظام.

التناوب الزراعي:

السابقة 1- الأنواع المستحسنة:



اللاحقة



السابقة 2- الأنواع الغير الملائمة:



اللاحقة

