

### ما هي الزراعات المساعدة؟



النعناع



الزعتر



اليازير

## الشوفلور



### ما هي الزراعات المرافقة؟



الجزر



الكرافس



الباربا

## فصيلة الخردليات

**الحرارة المفضلة:** من 15 إلى 27 درجة.

**عدد البذور في الغرام الواحد:** 500.

**مدة صلاحية البذور:** 5 سنوات.

**خصائص التربة:** الأراضي الندية المتوسطة القوام والغنية بالمواد العضوية.

**درجة الحموضة:** من 5,6 إلى 6,0.

**فترة الزراعة:** من فبراير إلى مارس و من يونيو إلى غشت.

**فترة النقل:** من 6 إلى 7 أوراق.

**فترة الجني:** من ماي إلى يوني و من شتنبر إلى اكتوبر.

**كمية زراعة البذور:**

بين الصنوف: 0,80 متر.

بين الشتلات: 0,60 متر.

**كثافة الشتلات:** من 30000 إلى 40000 في الهكتار.

**الإنتاج المرغوب فيه:** من 35000 إلى 40000 كيلوغرام في الهكتار.

حرث متوسط للتربة و تقسيمها إلى خطوط



زرع البذور في المشتل فوق سرير دافئ



يستحسن زرع الشتلات بعد سقي التربة مباشرة



نقل الشتلة إلى الأرض بعد 30 إلى 45 يوماً عند توأجد 6 أو 7 أوراق



## فصيلة الخردليات - الشوفلور

### 5 التناوب الزراعي:

#### 1- الأنواع المستحسنة:

السابقة



الجلبان



الثوم



البصل

اللاحقة



الباربا



اللفت



الجزر

#### 2- الأنواع الغير الملائمة:

السابقة



الفجل



الملفوف

اللاحقة



البطاطس



اللوبيا

### ما هي الإجراءات الوقائية ؟

4

- اختيار بذور سليمة و متأقلمة مع المناخ المحلي.



- غمر الجذور في خليط الطين و الغبار الطري



- عدم استعمال سماد أخضر من فصيلة الخردليات قبل الزرع



### 6 الأمراض:

**الخصائص:** تشكل بقع لامعة على السطح العلوي للأوراق تحول تدريجيا إلى اللون البني.

**كيفية المعالجة:** استعمال الحديدة الزرقاء (النحاس) استعمال محلول الحريقه و كذا محلول السالمية.

**الخصائص:** تظهر إصابة رمادية على الزهرة.

**كيفية المعالجة:** استعمال محلول الحريقه، عدم الإفراط في السقي و التسميد.

**الخصائص:** يتميز هذا المرض نتيجة أعراضه الواضحة الشبيهة بأورام كبيرة على الجذور.

**كيفية المعالجة:** استعمال محلول الحريقه.



الميلديو



العنف الرمادي



ورم القرنيبيط

### 7 الآفات:

**الخصائص:** نوع من الحشرات الصغيرة التي تتغذى على عصارة النباتات.



المن

**الخصائص:** حشرة صغيرة الحجم، ذات أجنبحة بأهداب طويلة للأنثى آلة وضع بيض يبيض منشارية وأجزاء الفم خادشة ماصة.



قرنبيط

**كيفية المعالجة:** استعمال منقوع الثوم



بالأعوض

**الخصائص:** يرقة الباوعوض تحفر في الاوراق منتجتا دهاليز و تنتقل الى الزهرة.



**كيفية المعالجة:** عزل المحصول بواسطة شبكة واستعمال فخاخ للإمساك بالباءوعوض.



الأبيض

استعمال محلول الشيبة.

**الخصائص:** يرقة فراشة تدمر الزهرة و الشتلات.

**كيفية المعالجة:** استعمال محلول الحريقه، الثوم، الفلفل الحار، الشيبة و الأوكاليبتوس.



المركز العربي



المركز العربي



مؤسسة فرنسا



FONDATION  
DE  
FRANCE



TERRE  
de  
France