

## الكريفة



## فصيلة القرعيات

**الحرارة المفضلة:** من 15 إلى 30 درجة.  
**عدد البذور في الغرام الواحد:** من 10 إلى 12.  
**مدة صلاحية البذور:** 4 سنوات.  
**خصائص التربة:** نقل الشتلة إلى الأرض بعد ظهور 2 أو 4 أوراق.  
**درجة الحموضة:** من 6,0 إلى 7,5.  
**فترة الزراعة:** من مارس إلى سبتمبر.  
**فترة النقل:** من 3 إلى 4 أوراق.  
**فترة الجني:** من ماي إلى نوفمبر.  
**كيفية زراعة البذور:**  
 بين الصفوف: 1,0 متر.  
 بين الشتلات: 0,50 متر.  
**كثافة الشتلات:** من 10000 إلى 12000 في الهكتار.  
**الانتاج المرغوب فيه:** من 20000 إلى 25000 كيلوغرام في الهكتار.

### 2 ما هي الزراعات المساعدة؟



النعناع



الحكمة



الحبق

### 3 ما هي الزراعات المرافقة؟



الخس



الذرة



الفجل

### 1 كيف يتم الزرع؟

اعداد التربة شهر قبل الزرع بعد تسميده  
 بمركب عضوي نصف ناضج



تزرع مباشرة وذلك بزرع 2 الى 3 بذور في الحوض



يمكن زرعها في المنبت بزرع بذرة واحدة في كأس زرع  
 لا يقل حجمه عن 4 سم



نقل الشتلة إلى الأرض بعد ظهور 2 أو 4 أوراق



4 ما هي الإجراءات الوقائية ؟

1- اختيار بذور سليمة و متألّمة مع المناخ المحلي



2- لا تزرع الكورجيط في أرض كانت بها أحد القرعيات سنتين لتجنب الامراض



3- تفادي الأسمدة العضوية الغنية بمادة الأزوت لتفادي فقدان الأزهار



4- تتبين التربة لتفادي نمو الأعشاب الضارة



5 التناوب الزراعي:

1- الأنواع المستحسنة:

السابقة



الفاصوليا

الفجل

الذرة

اللاحقة



الطماطم

الفلفل

البطاطس

السابقة

2- الأنواع الغير الملائمة:



القطناني

اللفت

الباذنجان

اللاحقة



الخيار

البورو

الجزر

6 الأمراض:

الخصائص: بقع بيضاء على السطح العلوي للورقة.  
كيفية المعالجة: استعمال الحديد الزرقاء (النحاس)  
استعمال محلول الحريقة و كذا محلول السالمية.



الميلديو

الخصائص: ظهور تشوهات على الاوراق و على الثمار.  
كيفية المعالجة: استعمال محلول الحريق قبل ظهور  
المرض للقضاء على المن لأنه يقوم بنقل الفيروس.



الفسيفساء  
الصفراء

الخصائص: بقع بيضاء على السطح العلوي للورقة.  
كيفية المعالجة: استعمال الكبريت و الرش باللبن.



الأوديوم  
(بوليان)

7 الآفات:

الخصائص: حشرة صغيرة تقوم بتجعيد الاوراق.  
كيفية المعالجة: استعمال محلول الحريقة و الثوم  
و الصابون الاسود.



المن

الخصائص: عنكبوت احمر صغير جدا يتغذى  
على اليخضور.



الرتيلة  
الحمراء

كيفية المعالجة: رش محلول البصل، قشور  
البطاطس و اوراق المربوت.

الخصائص: دودة برتقالية حلقيه.  
كيفية المعالجة: استعمال محلول  
المربوت و الأوكالبتوس.



الدودة  
السلكية

الخصائص: يرقة الفراشات الليلية.  
كيفية المعالجة: استعمال محلول الثوم والشيبية.



الدودة الرمادية