

ما هي الزراعات المساعدة؟ ②



الغلباز



الذرة



الكرافس

ما هي الزراعات المرافقة؟ ③



الكرنب



الخيار



الفجل



الكورجيت

اللوبيا



فصيلة القطنيات

الحرارة المفضلىة: من 17 إلى 25 درجة.

عدد البذور في الغرام الواحد: 3.

مدة صلاحية البذور: 3 سنوات.

خصائص التربة: خفيفة و جيدة الصرف..

درجة الحموضة: من 5.5 إلى 6.8.

فترة الزراعة: من مارس الى ماي و من غشت الى شتنبر.

فترة النقل: عند تواجد 3 أو 4 أوراق.

فترة الجني: من ماي الى يوليو و من اكتوبر الى دجنبر.

كيفية زراعة البذور:

بين الصفوف: من 0.5 إلى 0.7 متر.

بين الشتلات: 0.04 إلى 0.05 متر

كثافة الشتلات: من 250000 إلى 400000 في الهكتار.

الإنتاج المرغوب فيه: من 7000 إلى 10000 كيلوغرام في الهكتار.

كيف يتم الزرع؟ ①

استعمال سماد غير غني بالآزوت



الحرث و إعداد التربة



ترقيد البذور في الماء ملدة 24 ساعة



تزرع مباشرة أو في المنسابة



نقل الشتلة إلى الأرض عند تواجد 3 أو 4 أوراق



ما هي الإجراءات الوقائية؟

1- اختيار بذور سليمة و متأقلمة مع المناخ المحلي



2- وضع البذور في مزيج من الرماد و منقوع الثوم



3- احترام دورة زراعية تفوق 3 سنوات
رش النبتة بمixer السماد العضوي



الأمراض:

الخصائص: مسحوق أبيض على الأوراق. اصفرار الأوراق
كيفية المعالجة: استعمال الكبريت و الرش بالبن..



الخصائص: ظهور بقع بنية على جميع أجزاء النبتة
كيفية المعالجة: استعمال منقوع الثوم و مطبوخ الساملية.



الخصائص: تجعيد الأوراق مع اصفرارها
كيفية المعالجة: استعمال منقوع الحريقه او الفضة



الآفات:

الخصائص: نوع من الحشرات الصغيرة التي تتغذى على عصارة النباتات.



كيفية المعالجة: استعمال محلول الحريقه و الثوم و الصابون الاسود.



الخصائص: حشرة صغيرة جداً ناططة تقوم بتشويه و تجفيف الأوراق.

كيفية المعالجة: استعمال منقوع البابونج.



الخصائص: يرقة ذبابة تحفر في الأوراق منتجة دهاليز و تنتقل إلى الثمار.



كيفية المعالجة: عزل المحصول بواسطة شبكة و استعمال فخاخ لإمساك الذبابة استعمال مطبوخ المريوت بانتظام.



الخصائص: حشرة صغيرة جداً تسبب اصفرار الأوراق.



كيفية المعالجة: استعمال محلول الثوم و مطبوخ الشيبة.

التناوب الزراعي:

1- الأنواع المستحسنة:



اللاحقة



2- الأنواع الغير الملائمة:



اللاحقة

